

เทคนิคการเพิ่มคุณภาพผลผลิต

หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม



โซตัส

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

AGROW
AWARDS
2011

BEST COMPANY
FROM AN EMERGING REGION
Sotus International Company Limited

โรคและแมลงศัตรู หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม

ทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ 20 ลิตร



หนอนกระทู้หอม



เพลี้ยไฟ



โรคแอนแทรคโนส



โรคใบจุดสีม่วง



ตัวหนอน จะกินใบหอมเป็นรูแล้วเข้าไปอยู่ภายใน จากนั้นจะกัดกินทำลายใบหอมจนเสียหาย ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลง

ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบหอมหรือกระเทียม ทำให้ใบที่ถูกทำลายเกิดรอยด่าง หรือ รอยแผลสีน้ำตาลใบแห้ง ต้นหอม และกระเทียม เจริญเติบโตช้า และผลผลิตลดลง

มีจุดสีดําเล็กๆ บริเวณกาบนอกสุดของหัว จนเกิดแผลจำนวนมาก และขยายใหญ่ขึ้น จะเห็นกลุ่มของเชื้อราได้ชัดเจนขึ้น จากนั้นเชื้อจะลุกลามสู่กาบใบชั้นใน ทำให้เกิดอาการหัวเน่า และลำต้นเลื้อยไปตามแปลง

ใบของหอมจะแบน บิด และยืดยาวออก (เลื้อย) ต่อมาจะพบแผลสีซีวหม่น และจุดสีดําเล็กๆ เรียงซ้อนเป็นวงอยู่ในบริเวณแผล เมื่อแผลขยายขนาดใหญ่จะทำให้ใบหักพับ ต้นทรุดโทรมและแห้งตายไปตามแปลง

ใบหอมจะเริ่มมีจุดสีขาว แล้วขยายกว้างออกเป็นแผลรูปไข่ มีสีน้ำตาลอ่อน ขอบแผลจะเป็นสีน้ำตาลแก่หรือม่วงอ่อน ใบแห้งตายและไม่งอกหัว



ไปน็อกซ์
อัตรา 20-30 ซีซี



แจคเก็ต
อัตรา 5-10 ซีซี



เบ็นตัส เอสซี
อัตรา 15-20 ซีซี

หรือ



เทป
อัตรา 10-15 ซีซี



ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45
อัตรา 40-60 กรัม



เทป
อัตรา 10-15 ซีซี

แพนเทอรา® 40 อีซี



- กำจัดวัชพืชใบแคบได้เด็ดขาด
- ฉีดพ่นทับได้ ปลอดภัยต่อต้นหอม และกระเทียม



เค-ฮิวเมท เทซ



- ทำให้ดินร่วนซุย
- รากพืชดูดปุ๋ยได้มากขึ้น
- ลดปริมาณการใช้ปุ๋ย ลงได้ 15-20%



อัตราการใช้ 200 ซีซี ต่อไร่ 50 กิโลกรัม

ไดเทน™ เอ็นที เอ็ม-45




- เทคโนโลยีเพื่อการทนฝนโดยเฉพาะ
- สามารถป้องกันกำจัดโรคพืชได้มากกว่า 400 ชนิด ใน 70 พืช
- ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง
- ให้ธาตุแมงกานีส และสังกะสี ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ทำให้พืชสมบูรณ์แข็งแรง

เทคนิคการเพิ่มคุณภาพผลผลิต หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม

ทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ 20 ลิตร



ควบคุมการงอก
ของวัชพืช
ทั้งใบแคบและใบกว้าง



เคลต่าคลอร์
อัตรา 150 ซีซี

เร่งการแตกราก กระตุ้นการดูดปุ๋ย
ใบเขียวเข้ม เสริมสร้าง
ให้ต้นสมบูรณ์แข็งแรง



นูตราฟอส
ซูเปอร์-เอ็น
อัตรา 40 กรัม



เกอมาร์
นาโน
อัตรา 20 ซีซี

กำจัดวัชพืชใบแคบหลังงอก
ฉีดพ่นทับได้ ปลอดภัยต่อ
หอม กระเทียม



แพนเทอรา 40 อีพี
อัตรา 60 ซีซี

เพิ่มการสะสมอาหาร เร่งการลงหัว
กลีบแน่น ช่วยขยายขนาดหัว



นูแทค
ซูเปอร์-เค
อัตรา 40 กรัม



โฟแมกซ์
คัลเซียมโบรอน400
อัตรา 5-10 ซีซี

น้ำหนักดี หัวแน่น หัวไม่ฝ่อ
หัวไม่เน่า สีสวย เก็บได้นาน



นูแทค
ซูเปอร์-เค
อัตรา 40 กรัม



โฟแมกซ์
คัลเซียมโบรอน400
อัตรา 5-10 ซีซี

พ่นหลังปลูกทันที
ก่อนคลุมฟาง

หลังปลูก 7-10 วัน
พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

พ่น ขณะที่วัชพืช
มีใบ 3-6 ใบ
ในขณะที่ดินมีความชื้น

หลังปลูก 40-45 วัน
พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน

ก่อนเก็บเกี่ยว 15-20 วัน
พ่น 1-2 ครั้ง ห่าง 7 วัน