

โรคและแมลงที่สำคัญ

ทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ 20 ลิตร



โรคใบไหม้ หรือ โรคใบจุดตาเสือ (*Phytophthora colocasiae*)

ทันด่วน




เอตโตเดค
อัตรา 50 กรัม

หรือ



โซแลกซิล
อัตรา 50 กรัม




โรคหัวเน่า เกิดจากเชื้อรา (*Sclerotium rolfsii*)

ทันบริเวณโคนต้น



จอยม์
อัตรา 50 ซีซี



หนอนกระทู้ผัก

ทันด่วน




ลอร์สแบน
อัตรา 50 ซีซี

สลับ



เอิกชอล
อัตรา 15-20 ซีซี



มุ่งมั่น พัฒนา เพื่อความก้าวหน้า และยั่งยืนของเกษตรกร



เทคนิคการเพิ่มผลผลิต

เฟือก

คุณภาพ



เฟือกหัวใหญ่ ทรงสวย เนื้อแน่น น้ำหนักดี

เทคนิคการเพิ่มผลผลิต **เผือก** คุณภาพ



ทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ 20 ลิตร

ระยะกำจัดวัชพืช



พ่นด้วย



โปรลิค
อัตรา 100 ซีซี

พ่นด้วย



แพนเทอรา 40 อีซี
อัตรา 60-100 ซีซี



โปรลิค
อัตรา 100 ซีซี

ควบคุมวัชพืช

กำจัดวัชพืชหลังจากพ่นโคน

ระยะบำรุงต้น (อายุ 1-3 เดือน)



พ่นด้วย



โกมาร์ นาโน
อัตรา 20 ซีซี



นูพอร์ท-เอิ้น
อัตรา 30 กรัม

(พ่นทุก 7-14 วัน)

เร่งการสร้างใบใหม่และบำรุงต้น

ระยะขยายหัว สร้างแป้ง (อายุ 4-6 เดือน)



พ่นด้วย



โกมาร์ นาโน
อัตรา 20 ซีซี



นูพอร์ท-เอิ้น
อัตรา 50 กรัม



โฟแม็กซ์
คัลเซียมโบรอน 400
อัตรา 20 ซีซี

(พ่นทุก 7-14 วัน)

เผือกหัวใหญ่ ทรงสวย เนื้อแน่น น้ำหนักดี



คำแนะนำ

ทุกครั้งที่มีการหว่านปุ๋ย ควรคลุกด้วย โอมอนท์-เทรพ อัตรา 50 ซีซี ต่อปุ๋ย 1 กระสอบ จะทำให้ต้นเผือกดูดปุ๋ยได้ดีขึ้น สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้



คำแนะนำ

*ทุกครั้งที่มีพ่นสารเคมีหรือปุ๋ยทางใบ ควรผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพ โคมอนเวท อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อการแผ่กระจายจับติดใบพืชและประหยัดต้นทุน



คุณสมบัติเด่น **เอ็กซ์อล**® สารกำจัดแมลง

- กำจัดเพลี้ยไฟ และหนอนได้มากชนิด
- เห็นผลทันที ภายใน 6-24 ชั่วโมง หลังพ่น
- ออกฤทธิ์ทั้งแบบดูดตัวตาย และกินตาย
- เหมาะสำหรับผลผลิตพืชผัก และไม้ผลปลอดสารด้วย
- ระยะหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวสั้น 1-3 วัน



ไอมีท์ 570 อีทีบีแอลยู สารกำจัดโรคราแป้ง

- กำจัดได้ทั้งโรคราแป้ง และราดำ ของโรคราแป้ง
- มีประสิทธิภาพในการกำจัดได้นาน 14-21 วัน จากการพ่นเพียงครั้งเดียว
- ปลอดภัยต่อแมลงที่เป็นประโยชน์ เช่น ผีเสื้อ ไรตัวห้ำ และแมลงช้างปีกใส ฯลฯ