



การดูแลรักษา

“ลิลาวดี”



ไบตัส
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ



โรคและแมลงศัตรู สีสาวดี

ทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ 20 ลิตร

โรคราสนิม	โรคลำต้นเน่า	เพลี้ยแป้ง	เพลี้ยไฟ	เพลี้ยหอย	แมลงหวี่ขาว
					
มักพบที่ใบ สังเกตด้านใต้ใบจะพบผงสีขาวสีเหลือง เป็นกระจุกกระจายอยู่ที่ใบ หากเป็นมากใบจะเหลืองและร่วง มักเกิดในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่อากาศชื้น และเย็น	สาเหตุเกิดจากเชื้อราเข้าทำลาย ทำให้ลำต้นเน่า ใบ และยอดคุดงา เจริญและกลายเป็นสีน้ำตาล ใบร่วง เมื่อผ่าดูภายในลำต้นจะพบเนื้อเยื่อเน่าเป็นสีดำ ถ้าสังเกตภายนอกจะพบยอด และผิวของกิ่งที่เหี่ยวแห้ง ใบเหี่ยวยุบลง	ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน และลำต้น หากระบาดมากจะทำให้ต้นไหม้ เพื่อป้องกันจะถ่ายมูลที่เป็นน้ำหวานเพื่อล่อหมีต่อมากิน และนำฟอสเฟตไปเคลือบใบไปถึงที่ต่างๆ น้ำหวานนี้ยังทำให้ใบเกิดราดำประปรายบนต้นอีกด้วย	ดูดกินน้ำเลี้ยงของพืช ทำให้อายุและใบบิดเบี้ยว กลายเป็นสีน้ำตาล และหลุดร่วง พบการระบาดในช่วงที่มีอากาศร้อน และแห้งแล้ง	ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณลำต้นของพืช มักพบบนลำต้นกิ่งอ่อน ใบ หรือสายยอด บริเวณลำตัวมีขี้ผึ้งหุ้มอยู่ ทำให้กำจัดได้ยาก	ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงของพืช มักพบบริเวณด้านหลังของใบ และสามารถระบาดได้ตลอดทั้งปี
 เพนโตซ เพื่อกำจัดเชื้อราป้องกันโรคใบไหม้ อัตรา 40 กรัม (ฉีดพ่นทุก 7 วันให้ทั่วทั้งต้นในและใต้ใบ) หรือ  ซาราล หากพบการระบาด อัตรา 40 ซีซี. (ฉีดพ่นทั้งใบทุก 5-7 วัน จนกว่าผลของการระบาดจะลดลงจากใบใหม่ใบต่อไป)	 เพอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์ อัตรา 60 ซีซี (จำนวนใบไม้ต้นต้น)	 สตาร์เกิล อัตรา 20 กรัม (ฉีดพ่นทั้งใบเมื่อพบการเข้าทำลาย) หรือ  สตาร์เกิล จี อัตรา 20 กรัม (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง) อัตรา 30 กรัม (ระยะเวลา 12-20 ชั่วโมง) อัตรา 50-100 กรัม ต่อต้น ต่อความสูง 1 เมตร สำหรับปลูกกลางแจ้ง (โรยรอบโคนต้น)	 แจคเก็ต อัตรา 10 ซีซี. ฉีดพ่นเมื่อพบการเข้าทำลาย	 สตาร์เกิล อัตรา 20 กรัม (ฉีดพ่นเมื่อพบการเข้าทำลาย) +  เอสเค 99 อัตรา 50 ซีซี. (ฉีดพ่นเมื่อพบการเข้าทำลาย) หรือ  สตาร์เกิล จี อัตรา 20 กรัม (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง) อัตรา 30 กรัม (ระยะเวลา 12-20 ชั่วโมง) อัตรา 50-100 กรัม ต่อต้น ต่อความสูง 1 เมตร สำหรับปลูกกลางแจ้ง (โรยรอบโคนต้น)	 สตาร์เกิล อัตรา 15 กรัม (ฉีดพ่นทั้งใบเมื่อพบการเข้าทำลาย)

สตาร์เกิล จี
สารกำจัดแมลงสำหรับป้องกัน หนอน หรือ โรยรอบโคนต้น

อัตราการใช้
• ระยะเวลา
ระยะแรกพบตัวอ่อน 12 ชั่วโมง 20 กรัม
ระยะกลาง 12-20 ชั่วโมง 30 กรัม
• ปลูกอ่อน 50-100 กรัม ต่อต้น ต่อความสูงของต้น 1 เมตร

เพอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์

- สารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งการป้องกัน และกำจัด
- ช่วยป้องกันกำจัดโรคจากใบไหม้เน่า โรยรอบโคนต้น โรยหน้า ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วรดน้ำ และฉีดพ่นให้ทั่วต้น

ซาราล

- สารป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึม สารป้องกันทั้งใบ
- สามารถป้องกันกำจัดโรคราสนิมได้ก่อนมีระยะฟักตัว

ออสโมไลท์
ปุ๋ยเคมีสูตรผสมธาตุอาหารหลักอาหารพืช ให้พืชได้รับธาตุอาหารต่อเนื่องยาวนาน 3-6 เดือน

  

สูตร 15-30-15 14
สูตร 15-30-15 14
สูตร 15-30-15 14

แจคเก็ต

- สารกำจัดแมลง ประสิทธิภาพสูง
- ป้องกันกำจัด เพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ หนอนใยผัก หนอนคืบ และใยแมงมุมได้เป็นอย่างดี

การดูแลรักษา สีดาวดี

ปลูกอัตราแนะนำพรมน้ำ 20 ลิตร

การขยายพันธุ์			การออกดอก	
การเพาะเมล็ด	การปักชำ	เสียบยอด	การเตรียมต้นก่อนออกดอก	การบำรุงดอก
				
กระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นกล้า	ป้องกันกิ่งปักชำเน่า	ช่วยให้สมานแผลเร็ว แตกยอดใหม่ได้ดี	เร่งการสะสมอาหารสร้างตาดอก	ออกดอกสมบูรณ์ บานทน
 บูตราฟอส ซุปเปอร์-เอ็น อัตรา 30 กรัม   เกอมาร์ บีเอ็น 86 อัตรา 20 ซีซี. (ฉีดพ่นทุก 15 วัน)			 ออสโมโค้ท สูตร 13-28-7+1.5% MgO อัตรา 10 กรัม ต่อกระถาง 10 นิ้ว (โรยรอบโคนต้น 1 ครั้ง ทุก 6 เดือน)  สำหรับฉีดพ่นทางใบ  บูตราฟอส ซุปเปอร์-เค อัตรา 30 กรัม   เกอมาร์ บีเอ็น 86 อัตรา 20 ซีซี. (ฉีดพ่นทุก 15 วัน)	
 เทอร์ราคลอรี ซุปเปอร์-เอ็กซ์ อัตรา 50 ซีซี. (ผสมน้ำรดหลังปักชำ)				
 เกอมาร์ บีเอ็น 86 อัตรา 20 ซีซี. (ฉีดพ่น 1 ครั้ง หลังเสียบยอด 7-10 วัน)				



ไบทัส
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

บริษัท ไบทัส อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล จำกัด

อาคารไฮดรัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02 984-0999 (ติดต่อ 20 คู่สาย) โทรสาร 02 984-0997-8