


เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์

ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆ ได้ดี เช่น ส้ม ทุเรียน พืชผักต่างๆ เช่น กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก บร็อคเคอรี่ ถั่วลิสงเตา กระเทียม พริก มะเขือเทศ สตรอเบอรี่ และพืชอื่นๆ เช่น ข้าว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง สนามหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ



ทุเรียน



ส้ม



พืชผักให้ผล



พืชผักกินใบ



ขิงและพืชหัวอื่นๆ



พืชในกลุ่มหอมกระเทียม



ตีนขาวดี



ชวนชม



ดาวเรือง



กล้วยไม้



ไม้ประดับ

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด www.sotus.co.th
อาคารโรดส์ เลขที่ 77 เมืองทองธานี ต.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02 984-0999 โทรสาร 02 984-0997-8

เทอร์ราคลอร์® ซุปเปอร์-เอ็กซ์

ออกฤทธิ์เฉียบพลัน

ด้วยสารควินโทซีน + อีทรีไดอะโซล

มั่นใจได้
ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี
จากเกษตรกรทั่วโลก



หยุด!

โรคพืช

ได้อย่างเฉียบขาด



โซตัส


ผลิตภัณฑ์คุณภาพ



จาก...ประเทศสหรัฐอเมริกา

เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์

- ประกอบด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช 2 ชนิด เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันช่วยให้กำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้อย่างเฉียบพลัน
- ออกฤทธิ์ได้ดีทั้งการป้องกันโรคไม่ให้เข้าทำลายพืช และการกำจัดโรคที่เกิดกับพืชปลูกแล้ว
- กำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดินทั้ง 5 ชนิดที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรครากเน่าโคนเน่าในแปลงเพาะกล้า และแปลงปลูกพืช
 - เชื้อราไฟทอปธอรา (*Phytophthora* spp.)
 - เชื้อราพิเทียม (*Pythium* spp.)
 - เชื้อราฟิวซาเรียม (*Fusarium* spp.)
 - เชื้อราไรซอคโทเนีย (*Rhizoctonia* spp.)
 - เชื้อราสเคลอโรเทียม (*Sclerotium* spp.)
- ช่วยป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคกล้ายุบ โรคหัวเน่า โรคเถาแห้ง โรคใบดิด โรคราเม็ดผักกาด ฯลฯ



คำแนะนำการใช้ เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์

ขั้นตอนการเพาะปลูก	ชนิดพืช	อัตราและวิธีการใช้
แปลงเพาะกล้า	พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป	60 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดแปลงเพาะให้เปียกชุ่ม (ประมาณ 1 ลิตร ต่อ 1 ตารางเมตร) ก่อนหรือหลังหว่านเมล็ดพันธุ์ 7-10 วัน
แปลงเพาะปลูก	พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป	30-60 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น หรือ ราดแปลงให้ทั่ว ก่อนหรือหลังปลูก 7-15 วัน
	ขิง แตงโม เผือก	60 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร รดหลุมปลูกโดยใช้สารละลายที่ผสมแล้ว 200-400 ซีซี. (1-2 กระป๋องนม) ราดดินทิ้งไว้ 1-2 วัน จึงหยอดเมล็ดพันธุ์
	ทุเรียน ส้ม ส้มโอ มะนาว	40-60 ซีซี. ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดดิน ให้เปียกชุ่มทั่วภายในบริเวณทรงพุ่ม
	ทุเรียน	สำหรับโรคใบดิดทุเรียน ใช้อัตรา 20-30 ซีซี. พ่นให้ทั่วต้น เมื่อเริ่มพบโรคเข้าทำลาย

ป้องกันและรักษา โรคพืช ได้อย่างเฉียบพลันทันใจ

เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์



โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน



โรคใบดิดทุเรียน



โรครากเน่าโคนเน่าส้ม



โรคราเม็ดผักกาด



โรคเหี่ยวพริก



โรคเน่าคอดินมะเขือเทศ



โรคเน่าดำกล้วยไม้



โรครากเน่าโคนเน่าแตงโม

เฉียบพลัน ทันใจ ต้องใช้

เทอร์ราคลอร์ ซุปเปอร์-เอ็กซ์