

Opacity

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

ออกซิน[®]

(สารเอ็นเอเอ)

AUXIN[®]

- ✓ เปลี่ยนเพศดอกเงาะ
- ✓ ลดการหลุดร่วง
- ✓ เร่งการเกิดรากของกิ่งชำ



ไบโอส

ตารางการใช้ออกซิน (Auxin 4.5% SL)

พืช	ประโยชน์	อัตราการใช้ (ต่อหน้า 20 ลิตร)	วิธีใช้
เงาะ	เปลี่ยนเพศดอกเป็นดอกเพศผู้	10-20 ซีซี	พ่นเป็นจุๆ เฉพาะช่อดอกเงาะบางช่อ ในระยะดอกตูมหรือเพิ่งเริ่มบาน
	เพิ่มขนาดผล ป้องกันผลร่วง	1-2 ซีซี	พ่นที่ผลเงาะเมื่อผลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร
ทุเรียน	ช่วยในการออกดอก	3-5 ซีซี	พ่นต้นทุเรียนทุก 10-20 วัน ตั้งแต่หลังการ เก็บเกี่ยวผล เพื่อให้ทุเรียนอยู่ในสภาพ สมบูรณ์เต็มที่
มะม่วง	ช่วยในการออกดอก	3-5 ซีซี	พ่นผสมกับโปแตสเซียมไนเตรต 300-500 กรัม เมื่อใบมะม่วงแก่จัดหลังแตกใบอ่อน ครั้งสุดท้ายแล้ว
	ป้องกันการร่วงของผล เพิ่มขนาดผล	2.5 ซีซี	พ่นที่ผลในระยะที่ผลมีขนาดเท่าหัวแมลงวัน และพ่นซ้ำทุกๆ 10 - 15 วัน
ลองกอง ลำสาด	ป้องกันการร่วงของผล	2-5 ซีซี	พ่นก่อนเก็บเกี่ยว 10-15 วัน
ลิ้นจี่ ลำไย	เพิ่มการออกดอกอย่างสม่ำเสมอ	3-5 ซีซี	พ่นต้นลิ้นจี่ ลำไย ที่ผ่านการพักตัวมาเต็มที่ แล้ว เตรียมพร้อมรอกะทบหนาวก่อน ออกดอกประมาณ 1 เดือน
	เพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสร	1-2 ซีซี	พ่นระยะก่อนดอกบาน
	ป้องกันการร่วงของผลอ่อน	3-5 ซีซี	พ่นเมื่อผลอ่อนมีขนาดเท่าหัวแมลงวัน
	เพิ่มขนาดและคุณภาพของผล	2.5-5 ซีซี	พ่นให้ทั่วต้นในระยะการเจริญเติบโตของผล



ตารางการใช้ออกซิน (Auxin 4.5% SL)

พืช	ประโยชน์	อัตราการใช้ (ต่อไร่ 20 ลิตร)	วิธีใช้
ส้ม	ป้องกันผลร่วง	2-3 ซีซี	พ่นต้นส้มในขณะที่มีผลอ่อนขนาดเท่าเมล็ดถั่วลิสง โดยใช้ใช้น้ำประมาณ 10-15 ลิตร/ต้น
	เร่งการเข้าสี	2-3 ซีซี	พ่นผลส้มเมื่อเริ่มเปลี่ยนสี
องุ่น	เพิ่มความสมบูรณ์ของเถา	1-2 ซีซี	พ่นก่อนตัดแต่งกิ่ง 7 วัน
	เร่งการเลื้อยของเถา และกระตุ้นตาออก	1-2 ซีซี	พ่นหลังตัดแต่งกิ่ง 3-5 วัน
	ป้องกันการร่วงของดอก	0.5 ซีซี	พ่นช่อดอกในระยะก่อนดอกบาน
	ป้องกันการร่วงของผล เพิ่มขนาดผล ชีดช่อผล	1-2 ซีซี	พ่นที่ช่อผล เมื่อผลมีขนาดเท่าหัวแมลงวัน
	ช่วยให้ผลเข้าสีสม่ำเสมอ	1-2 ซีซี	พ่นผลองุ่น เมื่อผลมีอายุ 80-90 วัน
พริก	เร่งการเจริญเติบโต และตั้งตัวเร็ว	0.5-1 ซีซี	พ่นเมื่อพริกอายุ 10 วัน และทุก ๆ 10-15 วัน
	เร่งการออกดอก ป้องกันดอก และผลร่วง	1-2 ซีซี	พ่นในระยะต้นพร้อมก่อนออกดอก และหลังจากนั้นทุก ๆ 7-10 วัน



การใช้ออกซินเพื่อเร่งราก



พืช	ประโยชน์	อัตราการใช้	วิธีใช้
มะนาว	เร่งราก	ใช้อัตรา 1:20 (50 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร)	ทาบริเวณแผลของกิ่งตอน
มะกรูด	เร่งราก	ใช้อัตรา 1:10 (100 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร)	ทาบริเวณแผลของกิ่งตอน
พืชไม่มีเนื้อไม้ กิ่งอ่อน	- เร่งรากของกิ่งปักชำ	45 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร	จุ่มปลายกิ่งลงในสารอย่างรวดเร็ว (quick dip method)
	- เร่งรากของกิ่งตอน	45 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร	ใช้พู่กันจุ่มสารแล้วทาบาง ๆ ที่รอยแผล หรือรอยควั่นด้านบน
พืชมีเนื้อไม้ กิ่งกิ่งอ่อนกิ่งแก่	- เร่งรากของกิ่งปักชำ	100 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร	จุ่มปลายกิ่งลงในสารอย่างรวดเร็ว (quick dip method)
	- เร่งรากกิ่งตอน	100 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร	ใช้พู่กันจุ่มสารแล้วทาบาง ๆ ที่รอยแผล หรือรอยควั่นด้านบน
พืชออกรากยาก กิ่งแก่	- เร่งรากของกิ่งปักชำ	100-170 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร	จุ่มปลายกิ่งลงในสารอย่างรวดเร็ว (quick dip method)
	- เร่งรากกิ่งตอน	100-170 ซีซี ต่อน้ำ 1 ลิตร	ใช้พู่กันจุ่มสารแล้วทาบาง ๆ ที่รอยแผล หรือรอยควั่นด้านบน

เร่งการเกิดราก
ของกิ่งชำ



โซตัส
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อาคารโซตัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-984-0989 (ยัดโน้ต 20 คู่สาย) โทรสาร 02-984-0997-8



@SOTUS



www.sotus.co.th