

จัมเปอร์®

Jumper®

อะซอกซิสโตรบิน (azoxystrobin)...25% SC (กลุ่ม 11)



คุณสมบัติ

- สารป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดดูดซึม สามารถดูดซึมและเคลื่อนย้ายเข้าสู่ท่อลำเลียงของพืชได้ดี จึงสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการงอกของสปอร์ และเส้นใยของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชได้อย่างทั่วถึง
- ออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดโรคพืชได้อย่างกว้างขวาง เช่น โรคแอนแทรคโนสในผลไม้ช่อคอกตำ โรคใบจุดสีม่วง โรคใบจุดดำ และโรคใบติดทุเรียน เป็นต้น



แอนแทรคโนสมะม่วง



แอนแทรคโนสพริก



แอนแทรคโนสทุเรียน



แอนแทรคโนสส้ม



ช่อคอกตำมะม่วง



ใบจุดสีม่วงพยอม



ใบติดทุเรียน



| พืช | โรคเป้าหมาย | อัตราการใช้ | วิธีการใช้ |
|--|--|-------------|---|
|  | แอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) | 10 ซีซี | พ่นในระยะติดผลจนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว |
|  | ช่อดอกดำ (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) | 5-10 ซีซี | พ่น 4 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ตั้งแต่ระยะแทงช่อดอกจนถึงระยะผลอ่อน |
|  | ใบติดทุเรียน (<i>Rhizoctonia solani</i>) | 20 ซีซี | พ่นเมื่อเริ่มพบอาการของโรค และพ่นซ้ำทุก 5-7 วัน |
|  | ใบจุดดำ (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) | 5 ซีซี | พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน หลังย้ายกล้าประมาณ 1 เดือน |
|  | แอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) | 5 ซีซี | พ่น 2-3 ครั้ง ทุก 7 วัน ในระยะติดผลจนถึงระยะก่อนเก็บเกี่ยว |
|  | แอนแทรคโนส หรือ กุ้งแห้ง (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i> , <i>Colletotrichum capsici</i>) | 10 ซีซี | พ่นในระยะดอกจนถึงระยะเก็บผล ทุก 7-10 วัน |
|  | ใบจุดสีม่วง (<i>Alternaria pomii</i>) | 5-10 ซีซี | พ่นเมื่อพบการระบาดของโรคทุก 7 วัน |
|  | แอนแทรคโนส หรือ หอมเลื้อย (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) | 10 ซีซี | พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน หลังย้ายกล้าประมาณ 1 เดือน หรือ เมื่อเริ่มพบการระบาดหอมเลื้อย |
|  | แอนแทรคโนส (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>) | 15-20 ซีซี | พ่น 2-3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน ในระยะก่อนพอมผล |
|  | ใบจุดดำ หรือใบเทียมร่วง (<i>Cercospora asparagi</i>) | 5-10 ซีซี | พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค ติดต่อกันทุก 7 วัน ไม่เกิน 5 ครั้งต่อฤดูปลูก |
|  | ใบจุดสีดำ (<i>Marssonina rosae</i>) | 5-10 ซีซี | เริ่มพ่นป้องกันเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาดของโรค โดยพ่นสลับกับสารกำจัดเชื้อราในกลุ่มอื่น เช่น ซาฟรอล |
|  | ราสนิมขาว (<i>Puccinia horiana</i>) | 5 ซีซี | เริ่มพ่นป้องกันเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะต่อการระบาดของโรค โดยพ่นสลับกับสารกำจัดเชื้อราในกลุ่มอื่นเสมอ เช่น กาบีน่า หรือ จอर्थ |
|  | ใบจุด (<i>Alternaria brassicicola</i>) | 5-10 ซีซี | พ่นเมื่อค่อนอายุ 25 วัน และพ่นซ้ำทุก 4-5 วัน เพื่อป้องกันการระบาดของโรค |
|  | ใบไหม้ (<i>Phytophthora infestans</i>) | 10-20 ซีซี | พ่นทุก 7 วัน เมื่อเริ่มพบการระบาดของโรคใบไหม้ |



โซฟัส

บริษัท โซฟัส อินเทอร์เน็ต จำกัด
อาคารโซฟัส เซอร์ 77 เมืองทองธานี ถนนวิภาวดี งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ 11120
โทรศัพท์ 02 984 0999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) โทรสาร 02 984 0997-8

