อัตราและวิธีการใช้

พืช	โรคพืช	เชื้อสาเหตุ	อัตราและวิธีการใช้ (ซีซี/ น้ำ 20 ลิตร)
มะม่วง	โรคราแป้ง	*Oidium* sp.	**พ่นเพื่อป้องกันการเกิดโรค** อัตรา 10 - 15 ซีซี พ่นทุก 10 วัน **พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค** อัตรา 20 - 30 ซีซี พ่นทุก 5 - 7 วัน
ทุเรียน	โรคแอนแทรคโนส (ดอกเน่า)	*Colletotrichum zibethinum*	
ฝรั่ง	โรคจุดสนิม จุดสาหร่าย	*Cephaleuros virescens*	
	โรคใบจุด	*Pestalotiopsis* sp.	
	โรคแอนแทรคโนส	*Colletotrichum gloeosporioides*	
มังคุด	โรคใบจุด	*Colletotrichum* sp., *Pestalotia* sp., *Pestalotiopsis* sp.	
ลิ้นจี่	โรคแอนแทรคโนส	*Colletotrichum* sp.	
ส้ม	โรคผลร่วง	*Botryodiplodia* sp., *Diplodia natalensis*, *Colletotrichum gloeosporioides*, *Phomopsis citri*	
	โรคราดำ	*Antennella citri*, *Capnodium citri*, *Meliola citrocolor*	
ส้มโอ	โรคจุดดำ	*Phyllosticta citricarpa*	
	โรคยางไหล	*Botryodiplodia* sp., *Diplodia* sp.	
องุ่น	โรคผลเน่า (อีบุบ) หรือโรคแอนแทรคโนส	*Colletotrichum gloeosporioides*	
	โรคกิ่งแห้ง	*Greeneria uvicola*, *Melaconium furiginium*	
พริก	โรคกุ้งแห้ง หรือโรคแอนแทรคโนส	*Colletotrichum gloeosporioides*	
มะนาว	โรคราดำ	*Capnodium citri* หรือ *Meliola* sp.	
กล้วยไม้	โรคปื้นเหลือง	*Pseudocercospora dendrobii*	
กุหลาบ	ใบจุดสีดำ	*Marssonina rosae*	
	โรคราสีเทา	*Botrytis cinerea*	

***แนะนำ** พ่นร่วมกับ สารแมนโคเซบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและการควบคุมโรค

โซตัส ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อาคารโซตัส เลขที่ 77 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 984 0999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) โทรสาร 02 984 0997-8

@SOTUS
www.sotus.co.th

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

BENTUS® SC

เบ็นตัส®

คาร์เบนดาซิม 50% SC (สารกลุ่ม 1) เอสซี

สารป้องกันกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งแบบป้องกันและกำจัดโรคพืช มีคุณสมบัติดูดซึมเข้าสู่พืชบริเวณที่เป็นสีเขียวของพืช และเคลื่อนย้ายไปกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้ดี

โซตัส ผลิตภัณฑ์คุณภาพ