

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

การ์แรต®

สารไพเรคลอราซ (prochloraz).....45% EW (กลุ่ม 3)

45% อีดับบลิว

ป้องกันและกำจัด

โรคแอนแทรคโนส

โรคช่อดอกดำ โรคดอกเน่า

โรคผลเน่า ได้อย่างดีเยี่ยม

"สูตร EW ปลอดภัยต่อดอก"



โรคน้ช่อดอกแห้งเหี่ยว



โรคเน่าบนผิวของมะม่วง



โรคพบน้ช่อดอกเหี่ยว



โรคผลเน่าทุเรียน



โรคเน่าบนผิวของพริก



ไบอัส

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ



การ์แรต®

45% อีตัมบลิว



การ์แรต 45% อีตัมบลิว เป็นสารป้องกันและกำจัดโรคพืชชนิดที่ดูดซึม (translaminar) อยู่ในรูป EW สามารถแทรกซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อของพืชได้ดี มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส โรคช็อคดอกดำ โรคสแคป โรคดอกเน่าและผลเน่า

อัตราแนะนำ : ชั้วรา 10-20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วทุก 7 วัน



โรคแอนแทรกซ์ใบมะม่วง




โรคช็อคดอกมะม่วง



โรคดอกเน่าทุเรียน



โรคของเน่าทุเรียน



โรคผลเน่างุ่น (สับรุม)



โรคแอนแทรกซ์ใบฝรั่ง



โรคของเน่าฝรั่งมังคุด



โรคผลเน่าส้ม



โรคแอนแทรกซ์ใบฝรั่ง



โรคแอนแทรกซ์ใบชะอม (ทองเหมือด)



โรคใบจุดดำทุเรียน



โรคแอนแทรกซ์ใบยอดข้าวโพ่

ข้อควรระวัง

*ห้ามใช้ในมะม่วงพันธุ์โบราณ ได้แก่ พันธุ์มันขุนศรี (บางขุนศรี), พันธุ์ทวายเคียนแก้ว (มันเคียนแก้ว), พันธุ์หนังกกลางวัน, พันธุ์ลิ้นงูเห่า, พันธุ์แก้วลิ้มวัง, พันธุ์ยายกล่า และพันธุ์พื้นบ้านอื่นๆ

*ในองุ่นสามารถใช้ช่วงอายุผลไม่เกิน 70 วัน และควรใช้อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันลูกตาย



บริษัท โบทัส อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด
อาคารโรดดี เทรดี้ 77 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง ๒.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02 984 0809 (สี่เส้น) 20 คู่สาย โทรสาร 02 984 0807-8

