

สารป้องกันกำจัด โรคพืช

บลาสโต้®



โรคไหม้คอรวง

โรคใบไหม้

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

บลาสโต้®

สาร ไอโซโพรโทไอเลน.....41.76% EC (กลุ่ม 6)



คุณสมบัติ :

- บลาสโต้ สามารถดูดซึมเข้าสู่ต้นข้าวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งทางใบและทางราก
- บลาสโต้ เคลื่อนย้ายภายในต้นข้าวได้ดี ทั้งทางยอด และใบอ่อน ออกฤทธิ์รบกวนการสังเคราะห์ไขมัน และทำให้ผนังเซลล์ของเชื้อสาเหตุโรคพืชไม่สมบูรณ์ จึงมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันกำจัด โรคกาบใบแห้ง (*Rhizoctonia solani*) โรคใบไหม้ หรือโรคไหม้คอรวง หรือ โรคเน่าคอรวง (*Pyricularia oryzae*)



โรคใบไหม้และโรคไหม้คอรวง

ใช้อัตรา 60 ซีซีต่อไร่

พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค และพ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 5-7 วัน



โรคกาบใบแห้ง

ใช้อัตรา 80 ซีซีต่อไร่

พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค และพ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 5-7 วัน



บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อาคารโซตัส เลขที่ 77 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02 984 0999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) โทรสาร 02 984 0997-8

