

สารกำจัดวัชพืช

# ไพเล็กซ์®

พ่นทับได้ ปลอดภัยต่อ ข้าวโพด



พ่นเมื่อข้าวโพด  
อายุ 14-21 วัน หลังหยอดเมล็ด  
(หรือวัชพืชงอก 3-5 ใบ)



0-2      3-6      7-13      14-21      22-30      วัน



อัตราการใช้ในข้าวโพด (พื้นที่ 6 ไร่)

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| ไพเล็กซ์<br>อัตรา 100 ซีซี  |   | โซซัน<br>อัตรา 200 ซีซี   |   | อะทราซีน<br>อัตรา 900 กรัม  |

1 ชุดพ่นได้ 6 ไร่





# กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างใน **ข้าวโพด**

## วัชพืชใบแคบ



หญ้าตีนนก



หญ้าตีนกา



หญ้าตีนติด



หญ้าปากควาย



หญ้านกสีชมพู



หญ้าดอกขาว

## วัชพืชใบกว้าง



ผักเบี้ยหิน



ผักโขม



ลูกใต้ใบ



สาบม่วง



ผัก殃



ผักปลาบ



ผักเสี้ยนผี



โคกกระสุน

## พินิจ...ประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืช “ไฟเล็กซ์”



ก่อนพ่น



อาการหลังพ่นไฟเล็กซ์ 7 วัน



หลังพ่น



บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
อาคารโซตัส เลขที่ 77 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
โทรศัพท์ 02 984 0999 โทรสาร 02 984 0997-8

