

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

กาแม็กซ์[®]

โพรไซมิโดน...50% WP (สารกลุ่ม 2)

Gamax



ไช้ตัส
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

กาแม็กซ์®

โพธิไซมิโดน...50% WP (สารกลุ่ม 2)

Gamax

คุณสมบัติ :

กาแม็กซ์... เป็นสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการงอกของสปอร์และการเจริญของเส้นใยเชื้อรา


กาแม็กซ์... ใช้ป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราได้หลายชนิด เช่น โรคแอนแทรคโนส โรคใบจุดสีม่วง โรคใบแห้ง โรคดอกร่วง โรคผลเน่า โรคเถาแห้งในองุ่น โรคใบไหม้มะเขือเทศ โรคกุ้งแห้งพริก โรคดอกสนิมกล้วยไม้

อัตราและวิธีการใช้ :

- ✓ ใช้อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อพบการระบาดของโรค พ่นซ้ำทุก 5-7 วัน สำหรับโรคใบจุดสีม่วง ใช้อัตรา 40 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร



โรคใบจุดสีม่วง
ในหอม



โรคแอนแทรคโนส
ในพริก



โรคแอนแทรคโนส
ในมะม่วง




โรคดอกสนิม
ในกล้วยไม้



โรคแอนแทรคโนส
ในองุ่น(อึบวบ)



โรคแอนแทรคโนส
ในทุเรียน



โรคดอกเน่า
ในทุเรียน



โรคผลเน่า
ในทุเรียน